





Quelques symptômes de la Sclérose en Plaques...

Dr. Sandra VUKUSIC
Hôpital Neurologique - LYON

Journée Annuelle d'Information sur la Sclérose en Plaques - Lyon, samedi 23 septembre 2006

Les formes évolutives



Journée Annuelle d'Information sur la Sclérose en Plaques - Lyon, samedi 23 septembre 2006



Troubles moteurs

- **Déficit moteur** = diminution de la force
- **Spasticité** = raideur
- **Troubles de l'équilibre**
- **Troubles de la coordination** = maladresse, tremblements



Troubles sensitifs

- **Paresthésies** = fourmillements
- Engourdissement, sensation d'engainement, peau cartonnée, double peau...
- **Douleurs**
- **Signe de Lhermitte**



Troubles sphinctériens

- **Troubles urinaires :**
 - ✓ Urgences mictionnelles, pollakiurie, fuites
 - ✓ Dysurie
 - ✓ Infections urinaires répétées
- **Troubles digestifs et ano-rectaux :**
 - ✓ Constipation
 - ✓ Impériosités fécales, incontinence



Troubles visuels

- **Névrite optique rétro-bulbaire** : baisse d'acuité visuelle subaiguë, douleurs à la mobilisation du globe oculaire, perturbation de la vision des couleurs
- **Diplopie** = vision double
- **Oscillopsie** = vision instable, qui bouge
- **Phénomène d'Uhthoff**



Troubles de l'extrémité céphalique

- **Névralgie du trijumeau**
- **Paralysie faciale**
- **Vertiges**
- **Dysarthrie** = gêne à articuler
- **Dysphagie** = gêne pour avaler, fausses routes



Autres symptômes

- **Fatigue**
- **Phénomènes paroxystiques**
- **Troubles de concentration et de mémoire**



Traitement des symptômes

- **Spasticité** LIORESAL[®], DANTRIUM[®], MYOLASTAN[®]
Kinésithérapie : étirements
- **Tremblements** RIVOTRIL[®]
- **Troubles sensitifs** antalgiques, AD tricycliques, anti-épileptiques
- **Troubles urinaires**
 - Hyperactivité du détrusor : CERIS[®], DITROPAN[®], DRIPTANE[®]
(anticholinergiques). Surveillance du RPM.
 - Hyperactivité du sphincter lisse : XATRAL[®], OMIX[®], JOSIR[®] (alpha-bloquants)
 - Troubles mixtes : association des 2 classes (après BUD)
 - Autosondages urinaires. Dérivation urinaire (Bricker)
 - Traitement des infections urinaires symptomatiques +++



Traitement des symptômes

- **Constipation**

Conseils hygiéno-diététique (boissons suffisantes, régime riche en fibres)

Laxatifs : DUPHALAC[®], MOVICOL[®], FORLAX[®].

Suppositoires : EDUCTYL[®]

- **Troubles sexuels**

VIAGRA[®], CIALIS[®], LEVITRA[®]

Injections intra-caverneuses : EDEX[®]

- **Fatigue** Amantadine (MANTADIX[®]), anti-dépresseurs, modafinil (MODIODAL[®])

- **Symptômes paroxystiques**

TEGRETOL[®], NEURONTIN[®]

- **Kinésithérapie, centre de rééducation, appareillages, bains froids**