



Traitement par FAMPYRA® 10 mg (fampridine)

PRINCIPE d'ACTION :

Inhibiteur des canaux potassiques, prolonge la repolarisation et améliore la formation du potentiel d'action dans les axones démyélinisés.

INDICATION :

Amélioration de la capacité de marche **des patients adultes atteints de sclérose en plaques** et présentant un handicap à la marche (EDSS 4-7) quelle que soit la forme de la maladie. Un tiers des patients est amélioré à J15.

POSOLOGIE :

1 cp le matin et 1 cp le soir à 12 h d'intervalle.

Comprimé à avaler en entier en dehors des repas.

Prescription initiale limitée à 14 jours.

Prescription réservée aux spécialistes en neurologie.

Contrôler la clairance de la créatinine (> 80 ml/min)

EVALUATION:

J1 :

- Epreuve de marche chronométrée sur au moins 7.50 m (chronométrer un ALLER et un RETOUR) par le neurologue ou le kinésithérapeute.

J15 :

- Epreuve de marche chronométrée sur au moins 7.50 m (chronométrer un ALLER et un RETOUR) par le neurologue ou le kinésithérapeute.

☛ **L'important est que l'évaluation de la marche soit effectuée dans les mêmes conditions (appareillage, horaire) et sur la même distance à J1 et J15.**

Si l'évaluation est faite par le kinésithérapeute, une fiche de liaison est proposée.

En cas d'inefficacité à J15, le traitement doit être arrêté.

CONTRE INDICATION :

- Epilepsie
- Traitement concomitant par Cimétidine.
- Insuffisance rénale, même légère ou modérée (clairance de la créatinine < 80 ml/min)
- Grossesse.
- Allaitement
- Précaution avec la prescription concomitante de propranolol, metformine, carvedilol.

EFFETS SECONDAIRES (les plus fréquents) :

- Diminution du seuil épileptogène
- Paresthésies
- Céphalées
- Etourdissements, troubles de l'équilibre
- Insomnie.