










Traitements de fond auto-injectables de la SEP

	Interféron				Acétate de glatiramère
Traitements	Avonex	Bétaféron	Extavia	Rebif	Copaxone
Mode d'injection	Intramusculaire	Sous cutanée	Sous cutanée	Sous cutanée	Sous cutanée
Fréquence (heure fixe)	1 x semaine	1 jour sur 2	1 jour sur 2	Lundi/mercredi/vendredi	Tous les jours
Sites d'injection	Cuisses Fesses (IDE)	Bras Cuisses Au-dessus des fesses Ventre	Bras Cuisses Au-dessus des fesses Ventre	Bras Cuisses Au-dessus des fesses Ventre	Bras Cuisses Au-dessus des fesses Ventre
Effets secondaires	Syndrome pseudo grippal	Syndrome pseudo grippal	Syndrome pseudo grippal	Syndrome pseudo grippal	Lésions cutanées (Sensation d'oppression thoracique)
Présentation	Prêt à l'emploi 	A reconstituer 	A reconstituer 	Prêt à l'emploi 	Prêt à l'emploi 
Mode de conservation	Au réfrigérateur	Température ambiante	Température ambiante	Au réfrigérateur	Au réfrigérateur
Dispositifs d'injection	Avopen 	Bétaject confort 	Extaviject 	Rebismart Rebidose 	Autoject 2 TM 