









## Présentation des traitements de fond de première ligne dans la SEP

	Interférons					Acétate de glatiramère	Teriflunomide	Diméthyl fumarate
	Interféron bêta -1a			Interféron bêta-1b				
Traitements	Avonex	Plegridy	Rebif	Bétaferon	Extavia	Copaxone	Aubagio	Tecfidera
Mode d'injection	Intramusculaire	Sous cutanée	Sous cutanée	Sous cutanée	Sous cutanée	Sous cutanée	Per os	Per os
Titration	oui	oui	oui	non	non	non	non	oui
Fréquence	1 x semaine	1 x 15 jours	Lundi/mercredi/vendredi	1 jour sur 2	1 jour sur 2	Tous les jours	1 cp/jour	1 cp 2X/jour
Sites d'injection	Cuisses Fesses (IDE)	Bras Cuisses Au-dessus des fesses Ventre	Bras Cuisses Au-dessus des fesses Ventre	Bras Cuisses Au-dessus des fesses Ventre	Bras Cuisses Au-dessus des fesses Ventre	Bras Cuisses Au-dessus des fesses Ventre	Pendant ou en dehors des repas	Pendant les repas
Effets secondaire	Syndrome pseudo grippal, (CI si dépression)	Syndrome pseudo grippal, (CI si dépression)	Syndrome pseudo grippal, (CI si dépression)	Syndrome pseudo grippal, (CI si dépression)	Syndrome pseudo grippal, (CI si dépression)	Lésions cutanées sensation d'oppression thoracique	Amincissement cheveux Troubles digestifs Allergies cutanées Surveillance biologique Attention GROSSESSE	Flushs, Nausées, diarrhées, douleurs abdo Surveillance biologique Attention GROSSESSE
Présentation								
Mode de conservation	Au réfrigérateur, max 15 jrs T°<25°C	Au réfrigérateur, max 25 jours T°<25°C	Au réfrigérateur, max 25 jours T°<25°C	Température ambiante	Température ambiante	Au réfrigérateur, max 25 jours T°<25°C	Température ambiante	Température ambiante
Dispositifs d'injection	