

# Présentation des traitements de fond de première ligne dans la SEP

	Interférons					Acétate de glatiramère		Teriflunomide	Diméthyl fumarate
	Interféron bêta -1a			Interféron bêta-1b					
Traitements	Avonex	Plegridy	Rebif	Bétaferon	Extavia	Copaxone 20 mg	Copaxone 40 mg	Aubagio	Tecfidera
Mode d'injection	Intramusculaire	Sous cutanée	Sous cutanée	Sous cutanée	Sous cutanée	Sous cutanée		Per os	Per os
Titration	oui	oui	oui	non	non	non		non	oui
Fréquence	1 x semaine	1 x 15 jours	Lundi/mercredi/vendredi	1 jour sur 2	1 jour sur 2	Tous les jours	3 fois / sem	1 cp/jour	1 cp 2X/jour
Grossesse	Stop dès début de grossesse, $\emptyset$ allaitement	Contraception $\emptyset$ grossesse, $\emptyset$ allaitement	Stop dès début de grossesse, $\emptyset$ allaitement	Stop dès début de grossesse, $\emptyset$ allaitement	Stop dès début de grossesse, $\emptyset$ allaitement	Stop dès début de grossesse, $\emptyset$ allaitement		Tératogénicité, $\emptyset$ allaitement, procédure d'élimination	Contraception $\emptyset$ grossesse, $\emptyset$ allaitement
Sites d'injection	Cuisses Fesses (IDE)	Bras - Cuisses - Au-dessus des fesses - Ventre	Bras - Cuisses - Au-dessus des fesses - Ventre	Bras - Cuisses - Au-dessus des fesses - Ventre	Bras - Cuisses - Au-dessus des fesses - Ventre	Bras - Cuisses - Au-dessus des fesses - Ventre		Pendant ou en dehors des repas	Pendant les repas
Effets secondaires	Syndrome pseudo grippal, (CI si dépression)	Syndrome pseudo grippal, réactions aux sites d'injection (CI si dépression)	Syndrome pseudo grippal, réactions aux sites d'injection (CI si dépression)	Syndrome pseudo grippal, réaction aux sites d'injection (CI si dépression)	Syndrome pseudo grippal, réaction aux sites d'injection (CI si dépression)	Réaction du site d'injection, lésions cutanées, sensation d'oppression thoracique post injection		Nausées et diarrhées, amincissement du cheveu, (max 6 mois), > tension artérielle, infections ORL ALLERGIE	Flushs, Nausées, diarrhées, douleurs abdominales infections, lymphopénies (LEMP)
Surveillance	<u>Avant le traitement et tous les 6 mois</u> : bilan hépatique, formule sanguine	<u>Avant le traitement et tous les 6 mois</u> : bilan hépatique, formule sanguine	<u>Avant le traitement et tous les 6 mois</u> : bilan hépatique, formule sanguine	<u>Avant le traitement et tous les 6 mois</u> : bilan hépatique, formule sanguine	<u>Avant le traitement et tous les 6 mois</u> : bilan hépatique, formule sanguine			<u>Tous les 15 jours / 6 mois par 3 mois</u> : bilan hépatique, formule sanguine, plaquettes, Tension Artérielle	<u>Tous les 3 mois max</u> : formule sanguine, lymphocytes, plaquettes
Mode de conservation	Au réfrigérateur, max 15 jrs T°<25°C	Au réfrigérateur, max 30 jours T°<25°C	Au réfrigérateur, max 25 jours T°<25°C	Température ambiante	Température ambiante	Au réfrigérateur, max 25 jours T°<25°C		Température ambiante	Température ambiante
Présentation Dispositifs d'injection									