






Traitements injectables 1ere intention dans la Sclérose En Plaques

	Interférons			Acétate de glatiramère	
	Interféron bêta -1a				
Traitements	Avonex®	Plegridy®	Rebif®	Copaxone® 20 mg	Copaxone® 40 mg
Mode d'injection	Intramusculaire	Sous cutanée			
Fréquence	1 x semaine	1 x 15 jours	3 x par semaine ex. Lundi/mercredi/vendredi	Tous les jours	3 x par semaine ex. Lundi/mercredi/vendredi
Grossesse	Arrêt possible début de grossesse, ø allaitement	Contraception ø grossesse, ø allaitement	Arrêt possible dès début de grossesse, ø allaitement	Arrêt possible dès début de grossesse, ø allaitement	
Sites d'injection	Face externe cuisses, Fesses (IDE)	60 points d'injection / 8 sites : arrière des bras, au-dessus des cuisses, au-dessus des fesses, ventre			
Effets secondaires	* Syndrome pseudo grippal : (12 à 24 h) Fièvre, courbatures, fatigue, céphalées * CI si dépression sévère	* Syndrome pseudo grippal : courbatures, fatigue, céphalées, fièvre (48 à 72h) * Réactions aux sites d'injection * CI si dépression sévère	(6 à 12h)	* Réaction du site d'injection : douleurs, induration, rougeur * Lésions cutanées * Sensation d'oppression thoracique post injection	
Surveillance	Tous les 6 mois : bilan hépatique (ALAT-SGPT), formule sanguine (NFs)				
Mode de conservation	Au réfrigérateur, (1 stylo maximum 15 jours < 25°C)	température < 25°C	Au réfrigérateur, maximum 14 jours < 25°C	température < 30°C	
Présentation Dispositifs d'injection	 Avonex® Pen™	 Stylo Plegridy™	 Rebismart™ Rebidose™	 20 mg	 Csync™ 40 mg