





Traitements oraux 1ere intention dans la Sclérose En Plaques

	Teriflunomide	Diméthyl fumarate
Traitements	Aubagio®	Tecfidera®
Fréquence	1 cp/jour à heure régulière	1 gl matin et 1 gl soir
Grossesse	Tératogénicité (animal), ø grossesse, ø allaitement, procédure d'élimination obligatoire si désir de grossesse 	Contraception, ø grossesse, ø allaitement 
Mode de prise	Pendant ou en dehors des repas	Au milieu des repas, au moins 4h entre 2 prises
Effets secondaires	* Nausées et diarrhées transitoires (inconfort digestif), * Amincissement transitoire des cheveux / diminution de la densité capillaire (les 6 premiers mois), * Céphalées, (cutanée) * Allergie	* Flushs ou bouffées congestives (rougeurs du visage / du torse transitoire après la prise du traitement), * Troubles gastro intestinaux (nausées, diarrhées, douleurs abdominales) * Lymphopénies (risque de LEMP)
Surveillance	Tous les 15 jours pdt 6 mois puis ts les 2 mois : Bilan hépatique (ALAT-SGPT), Formule sanguine (NFs), plaquettes, Tension Artérielle	Tous les 3 mois : Formule sanguine (NFs) dont lymphocytes , Bilan hépatique, créatinine
Présentation	 	Meilleure tolérance : titration 120mg puis 240mg 