

## FEUILLE DE SURVEILLANCE ET DE DEBIT DOSES SUIVANTES 600mg OCRELIZUMAB

Quand mesurer les signes vitaux	Heure	Température auriculaire	Pression sanguine (syst/dias) En mm/Hg	Fréquence cardiaque (par min)	Remarque (Arrêt provisoire, Diminution de débit (Si applicable))
<b>A la pose de la perfusion d'OCREVUS®</b> <b>Débuter la vitesse à 40ml/h</b>					
<b>30 min</b> après le début de la perf d'OCREVUS® (+/- 5 min) <b>Augmenter la vitesse à 80ml/h</b>					
<b>1h</b> après le début de la perf d'OCREVUS® (+/- 5 min) <b>Augmenter la vitesse à 120ml/h</b>					
<b>1h30</b> après le début de la perf d'OCREVUS® (+/- 10 min) <b>Augmenter la vitesse à 160ml/h</b>					
<b>2h</b> après le début de la perf d'OCREVUS® (+/- 10 min) <b>Augmenter la vitesse de 200ml/h</b>					
<b>2h30</b> après le début de la perf d'OCREVUS® (+/- 10 min)					
<b>3h00</b> après le début de la perf d'OCREVUS® (+/- 10 min)					
<b>3h30</b> après le début de la perf d'OCREVUS® (+/- 10 min) (Fin perfusion/début surveillance)					
<b>Surveillance après arrêt perf d'OCREVUS®</b>					
<b>4h</b> après le début de la perf d'OCREVUS®					
<b>4h30</b> après le début de la perf d'OCREVUS					