

Aubagio®

teriflunomide (Genzyme)

Présentation

Comprimés pelliculés 14 mg
Pentagonaux, de couleur bleue
Boîte de 28 comprimés
AMM 2014



Indication

À quoi ça sert ?

Traitement des patients adultes atteints de sclérose en plaques rémittente.

Mécanisme d'action

Comment ça marche ?

Agent immunosuppresseur aux propriétés immunomodulatrices. Il inhibe de façon sélective et réversible une enzyme (DHODH), impliquée dans la prolifération et le fonctionnement des lymphocytes B et T activés.

Posologie

Comment le prendre ?

- 1 comprimé de 14mg 1x/jour par voie orale.
- Comprimé à avaler entier avec un peu d'eau.
- Prise pendant ou en dehors des repas.

Effets Indésirables

- Perturbation du bilan hépatique (augmentation des ALAT).
- Amincissement transitoire des cheveux les 6 premiers mois.
- Nausées, diarrhées transitoires les 6 premiers mois.
- Infections des voies aériennes supérieures.
- Réactions allergiques cutanées.

Contre-Indications

Je ne dois pas prendre ce médicament si :

- Hypersensibilité à l'un des composants.
- Insuffisance hépatique sévère, Insuffisance rénale sévère.
- Infection active sévère non résolue, immunodéficience.



Grossesse et Allaitement

Grossesse et allaitement contre-indiqués sous Aubagio®.

Contraception efficace obligatoire chez les femmes en âge de procréer.

Si désir de grossesse, arrêt du traitement et nécessité d'une procédure d'élimination accélérée par :

- cholestyramine (Questran®) 8g 3x/jour pendant 11 jours
- ou 50g de charbon activé toutes les 2 heures pendant 11 jours.

En l'absence de procédure d'élimination, le produit peut mettre jusqu'à 2 ans pour s'éliminer



Surveillance, Précaution d'emploi et Mise en garde

Surveillance

Avant le traitement : pression artérielle, bilan hépatique, NFS, plaquettes.

Pendant le traitement : pression artérielle, bilan hépatique tous les 15 jours pendant 6 mois puis tous les 2 mois, et NFS et plaquettes tous les mois les 6 premiers mois.

Oubli

En cas d'oubli, prenez le médicament dès que vous constatez l'omission puis reprenez la suite normale du traitement.

Si la prochaine prise doit avoir lieu dans moins de 4 heures, ne prenez pas la dose omise et reprenez le traitement normal.

Il est important de ne pas doubler la dose pour compenser.